Tiroler Gebietskrankenkasse
TGKK
» Die Gesundheitskasse «

MODERNE WUNDVERSORGUNG
Allgemeine Information

- Die neue Bestellliste für die „Moderne Wundversorgung“ wurde von einem Fachgremium, bestehend aus (Fach-)ÄrztInnen, Diplomierten KrankenpflegerInnen mit Zusatzausbildung „Wundmanagement", VertreterInnen der ARGE Pflegeheime und der TGKK erstellt. Das Ergebnis dieser Liste soll dazu dienen, die Moderne Wundversorgung sicher zu stellen.

- Die Bestellliste wird in regelmäßigen Abständen neu evaluiert. Vorschläge sowie Anregungen nehmen wir gerne unter wundversorgung@tgkk.at oder unter der Postadresse: Tiroler Gebietskrankenkasse, Klara-Pölt-Weg 2, 6020 Innsbruck z.Hd. Abt. Infrastruktur, Tel. Nr. 059160/1113 entgegen.

- Diese „Allgemeine Information“ soll eine Unterstützung für die tägliche Arbeit sein. Es wird die Zusammensetzung, Wirkweise und Indikation der gelisteten Produkte beschrieben, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.
  In der „Allgemeinen Information“ finden sich so genannte „Nicht gelistete Produkte“.
  Dies dient lediglich dem informativen Produktevergleich und erleichtert das Auffinden von alternativen, bestellbaren, gelisteten Produkten.

- Können Patienten, nachweislich mit keinem der gelisteten Produkte zweckmäßig versorgt werden, besteht die Möglichkeit, die notwendigen Verbandsstoffe mit entsprechender Begründung und chefärztlicher Bewilligung über Bandagisten oder Apotheken zu verordnen.

Vorgangsweise:

- Die Bestellung bei der TGKK erfolgt mit Hilfe der 4-seitigen Bestellliste durch das jeweilige Pflegeheim oder Sozialsprengel /bzw. Hauskrankenpflege **nach ärztlicher Verordnung**.
  Die Verordnungen auf Rezepten und HBHM-Scheinen sind mit der Patienten-/Wunddokumentation aufzubewahren, Kontrolle durch die TGKK ist möglich.

- Die ärztliche Verordnung kann direkt mit Unterschrift und Stempel auf der Bestellliste, auf Rezept, oder auf Heilbehelfs/Hilfsmittel (HBHM)-Scheinen erfolgen.
  Für jede neue Packungseinheit bedarf es einer eigenen ärztlichen Verordnung. Dauerverordnungen sind nicht möglich.

- Weiterhin kann über das Internet auf der Homepage der TGKK (www.tgkk.at unter der Rubrik: Vertragspartner – Info – Moderne Wundversorgung) bestellt werden.
  In der Spalte „Kommentar“ muss der Namen der(s) Versicherten mit SV-Nummer, der Name des verordnenden Arztes und die Diagnose angegeben werden.
  Hilfreich ist auch die Angabe einer Telefonnummer für etwaige Rückfragen.

- Nach der Prüfung durch die Tiroler Gebietskrankenkasse wird die Bestellung an die Firma Onex weitergeleitet. Diese wird Ihnen in kürzester Zeit die Ware zustellen.
  Ihre Bestellungen können nur bearbeitet werden, wenn alle Angaben vollständig erbracht werden. Siehe bitte die erste Seite des Bestellformulars.

- **Bestellung bitte an die TGKK, Abteilung Infrastruktur, wundversorgung@tgkk.at oder FaxNr. 059160/51119.**
  Weitere Details sind in Verträgen zur „Moderne Wundversorgung“ zwischen TGKK und den jeweiligen Vertragspartnern geregelt.

Inhaltsverzeichnis

1.a. Saugkompressen…… 3

1.b. Aktivkohle Saugkompressen…….. 3

2. Wunddistanzgitter…… 3

3.a. Alginat-Verbände……..... 4

3.b. Vorwiegend vertikal absorbierende Faserkompressen…… 4

4a. Folien-Verände..... 4

4b. Hydrokolloid-Verbände..... 5

4c. Schaumstoff-Verbände..... 6

5. Wundgele……..... 7

6.a. Verbände mit Silber.....8

6.b. Verbände mit Aktivkohle und Silber…… 9

7.a. Polyacrylat-Verbände, mit Ringer Lactat getränkt.....9

7.b. Superabsorbierende Polyacrylat-Verbände ……...10

8. Wundrandschutz.....10

9. Wundspüllösungen.....11

10. Medizinischer Honig…….....11

11. Kollagen……12

1. Saugkompressen

Zusammensetzung: Schichtweise aufgebaute Saugkompressen, aus Baumwolle, Viskose und Polyester (1.b.: Kern: zusätzlich Aktivkohle)
Wirkungsweise: Mechanischer Schutz, verhindert das Eindringen von Bakterien, absorbiert Sekret und Bakterien (1.b: und Geruch)
Indikation: Akute Wunden, Sekundärverband

1.a. Saugkompressen

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3572	Zetuvit steril	10 x 10 cm	Hartmann	25 Stück
3461	Zetuvit steril	10 x 20 cm	Hartmann	25 Stück
3462	Zetuvit steril	20 x 20 cm	Hartmann	15 Stück
3761	Zetuvit steril	20 x 40 cm	Hartmann	5 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Vliwazell, Urgo-Pad Saugkompressen, Vliwin)

1.b. Aktivkohle Saugkompressen

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3040	Vliwaktiv Aktivkohle Saugkompr.	10 x 10cm	L&R	20 Stück
3041	Vliwaktiv Aktivkohle Saugkompr.	10 x 20 cm	L&R	20 Stück

2. Wunddistanzgitter

Zusammensetzung: Wundgitter aus Baumwolle, Viskose, Polyester oder Polyethylen mit- oder ohne Wirkstoffe imprägniert
Wirkungsweise: Verklebt nicht mit der Wunde, atraumatischer Verbandwechsel, Sekundärverband erforderlich

Produkte:

- Adaptic Wundverband Silikon: wirkstofffrei, Silikonbeschichtung
- Adaptic: wirkstofffrei, Vaseline – Beschichtung
- Lomatuell: wirkstofffrei, Paraffinbeschichtung
- Sorbion plus: wirkstofffrei, aus Polyethylen
- Inadine: wirkstoffhaltig: PVP-Jod – (Max.14 Tage)

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3762	Adaptic Wundverb. Silikon	7,6 x 5 cm	Chemomedica	10 Stück
3763	Adaptic Wundverb. Silikon	7,6 x 11 cm	Chemomedica	10 Stück
3765	Adaptic Wundverb. Silikon	12,7x 15 cm	Chemomedica	10 Stück
294	Adaptic	7,6 x 7,6 cm	Chemomedica	50 Stück
295	Adaptic	7,5 x 20 cm	Chemomedica	24 Stück
3087	Lomatuell	10 x 10 cm	L&R	10 Stück
3088	Lomatuell	10 x 20 cm	L&R	10 Stück
3668	Sorbion Plus	7,5 x 7,5 cm	Sorbion	25 Stück
3669	Sorbion Plus	10 x 10 cm	Sorbion	25 Stück
3670	Sorbion Plus	10 x 20 cm	Sorbion	25 Stück
300	Inadine (PVP-Jod max. 14 Tage)	5 x 5 cm	Chemomedica	25 Stück
301	Inadine (PVP-Jod max. 14 Tage)	9,5 x 9,5 cm	Chemomedica	10 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Atrauman, Branolind, Cuticerin Slb Gaze, Grassolind, Hydrotüll, Jelonet, Tegaderm Contact, Urgotüll, Mepitel Netzauflage, Askina Silnet, Bactigras Gazeverb., Urgotüll Silver, u.v.m.)

3a. Alginat-Verbände

Zusammensetzung: Zu Vlies verarbeitete Polysacharid- und Calciumalginatfasern
Wirkungsweise: Optimaler Wundfüller. Absorbieren Wundsekret, wandelt sich in ein blutstillendes, pH- Wert senkendes, bakteriostatisches Gel um, schaffen so ein optimales feuchtes Milieu zum Aufweichen und Ablösen von Belägen
Hinweis: Alginat-Verbände nicht über die Wunde hinaus reichen lassen!
Indikation: Exsudierende, fibrinbelegte, Wunden, ev. frische Spalthautentnahmestellen, Sekundärverband erforderlich

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
248	Suprasorb ST/A Tamp.	2 g x 30 cm	L&R	5 Stück
3050	Algisite M Wundtamp.	2 g x 30 cm	Smith & Nephew	5 Stück
246	Suprasorb ST/A	5 x 5 cm	L&R	10 Stück
247	Suprasorb ST/A	10 x 10 cm	L&R	10 Stück
3047	Algisite M Wundverb.	5 x 5 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3048	Algisite M Wundverb.	10 x 10 cm	Smith & Nephew	10 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Askina Sorb, Sorbsan calc. , Algosteril, Biatain Alginatkompresse, Curasorb Alginat, Cutimed Alginat, Decutastar Alginat, Kaltostat, Meglisorb, Seasorb soft, Sorbalgon, Tegagen, Tegaderm Alginate, Trionic Alginat, Urgosorb, Trionic Alg., Woundmate Alginat, u.v.m.)

3b. Vorwiegend vertikal absorbierende Faserkompressen

Zusammensetzung: Zu einem Vlies verarbeitete Fasern, meist aus Cellulose-Ethylsulfonat-oder Natriumcarboxymethylcellulose.
Wirkungsweise: Absorbiert Wundsekret unter formstabiler Gelbildung, Vorwiegend vertikale Saugkraft, schützt Wundränder, Wundfüller. Verbandliegezeit von bis zu sieben Tagen möglich.
Indikation: Oberflächliche - bis tiefe Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation, Sekundärverband erforderlich

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3767	Aquacel Tamponade mit verstärkter Faser	2 x 45 cm	Convatec	5 Stück
3768	Durafiber	5 x 5 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3769	Durafiber	10 x 10 cm	Smith & Nephew	10 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Aquacel Kompressen, Aquacel extra, Urgoclean Kompressen, u.v.m.)

4.a. Folien-Verbände

Zusammensetzung: Einschichtige Polyurethanschicht mit Polyacrylatklebefläche

Wirkungsweise: Transparenter Wundverband, absorbiert kein Wundsekret, hält die Wunde feucht, ist atmungsaktiv
Verhindert das Eindringen von Bakterien und Feuchtigkeit

Indikation: Primäre Auflage bei epithelisierenden, nicht nässenden Wunden.
Sekundäre Wundauflage zur Fixierung anderer Produkte

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3552	Suprasorb ST/F Folie	5 x 7 cm	L&R	10 Stück
3553	Suprasorb ST/F Folie	10 x 12 cm	L&R	10 Stück
3063	Opsite Flexifix unsteril	10m x 10 cm	Smith & Nephew	1 Rolle

(Nicht gelistete Produkte: Askina Derm, Askina thinsite, Bioclusive, Blisterfilm, Decutastar pur film, Hydrofilm, Mepitel Film, Mepore Film, Opsite Flexigrid, Optiskin Film Folie, Polyskin Filmvb., Tegaderm /-HP, Tegaderm absorbent, Fixomull transparent, Suprasorb UST/F, Xatra Perme-Roll, Hydrofilm Roll, Mepore Film Roll, Tegaderm Roll, u.v.m.)

4.b. Hydrokolloid-Verbände

Zusammensetzung: Hydrophobes Polymergerüst aus Polyisobutylen, darin eingelagert hydrokolloide Partikel (Carboxymethylcellulose, Gelatine, Pektine)

Wirkungsweise: Selbsthaftende Verbände. Der Hydrokolloid-Anteil bildet mit dem Wundsekret eine Gelstruktur, die die Wunde feucht hält. Semipermeable, keim- und wasserdichte Deckschichte. Verbandliegezeit von bis zu sieben Tagen möglich.

Indikation: Wenig sezernierende und epithelisierende Wunden

Kontraindikation: Infizierte Wunden, freiliegende Muskeln, Sehnen oder Knochen, ischämische Ulcera, durch chronische Infektionen (Tuberkulose, Syphilis, AIDS oder tief gehende Pilzinfektionen) oder Tumore verursachte Geschwüre

Ökonomischer Einsatz:
- Sollten mehrere Tage auf der Wunde verbleiben können
- Keine Kostenübernahme als Sekundärverband (nicht in Kombination mit Wundgelen/Alginaten, usw.)

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3573	Hydrocoll Wundverb.	7,5 x 7,5 cm	Hartmann	10 Stück
261	Hydrocoll Wundverb.	10 x 10 cm	Hartmann	10 Stück
3296	Hydrocoll thin	7,5 x 7,5 cm	Hartmann	10 Stück
3524	Hydrocoll thin	10 x 10 cm	Hartmann	10 Stück
3770	Varihesive ex-due	10 x 10 cm	Convatec	5 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Suprasorb ST/H, Varihesive ex.-due,/-E/Border/ -signal, Comfeel Plus Flex/transparent, Tegaderm Hydrocolloide., Nu-Derm, Gota-Derm, Ultec Pro, Askina Hydro, /- Tegasorb, Algoplaque, …mit Silber: Contreet-H Hydrokoll. mit Wundkissen: Combiderm, Alione ..mit Schaumst.: Versiva, u.v.m.)

4c. Schaumstoff-Verbände

Geschlossenporige Schaumstoff-Kompressen:

Zusammensetzung: Weicher Polyurethanschaum mit Polyurethanfolie mit oder ohne Kleberand (adhesive/non adhesive/bzw. NKL)

Wirkungsweise: Nimmt Sekret auf (auch unter Kompression), hält die Wunde feucht, verhindert das Eindringen von Bakterien und Feuchtigkeit, Wasserdampf- und Gasaustausch ist möglich. Als Primär- und Sekundärverband, kann zugeschnitten werden. Je nach Exsudat-Menge Wechsel erst nach bis zu 7 Tagen.

Indikation: Sezernierende Wunden

Produktbesonderheiten:

- Biatain IBU softhold: Setzt bis zu 7 Tage das Medikament Ibuprofen frei **Indikation: z.B. PAVK mit starken Ruheschmerz**
- Mepilex und Mepilex border: Wundseitig silikonisierte Oberfläche
- Allevyn Gentle Border: Wundseitig silikonisierte Oberfläche
- Aquacel foam non adhesive: Kombination mit vertikal absorbierender Faser

Offenporige Schaumstoff-Kompressen: (Momosan weiss)

Zusammensetzung: Polyurethan-Schaum

Wirkungsweise: Nimmt Exsudat auf, hält die Wunde feucht, Wasserdampf- und Gasaustausch ist möglich.
Kann zugeschnitten werden, erfordert Fixierung.
Der Verbandswechsel alle 1-2 Tage, um Einwachsen zu vermeiden.

Indikation: präoperative Wundgrundkonditionierung, sezernierende Wunden

Für alle Schaumstoffverbände gilt: Keine Kostenübernahme möglich als Lagerungsbehelf oder für Dekubitus- Prophylaxe!

Kontraindikation: Trockene Wunden, Wunden mit freiliegenden Sehnen und Knochen, Infizierte Wunden (relative Kontraindikation)

Hinweis: Nicht zusammen mit oxidierenden Substanzen wie Hypochlorit Lösungen oder Wasserstoffperoxid verwenden!

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3104	Allevyn Adhesive	7,5 x 7,5 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3105	Allevyn Adhesive	12,5x12,5 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3109	Allevyn Non Adhesive	5 x 5 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3110	Allevyn Non Adhesive	10 x 10 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3594	Allevyn Non Adhesive	10 x 20 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3771	Allevyn lite	10 x 10 cm	Smith & Nephew	20 Stück
3671	Suprasorb ST/P NKL	7,5 x 7,5 cm	L&R	10 Stück
3672	Suprasorb ST/P NKL	10 x 10 cm	L&R	10 Stück
3673	Suprasorb ST/P NKL	15 x 15 cm	L&R	5 Stück
3107	Allevyn sacrum	17 x 17 cm	Smith & Nephew	10 Stück

3113	Allevyn heel Ferse	10,5 x 13,5 cm	Smith & Nephew	5 Stück
3772	Tegaderm foam adhesive, rund Art. 90615	6,9 x 6,9 cm	3M	10 Stück
3773	Tegaderm foam adhesive, rund Art. 90614	6,9 x 7,6 cm	3M	10 Stück
3576	Tegaderm foam adhesive, rund Art. 90619	13,97 x 13,97 cm	3M	5 Stück
3121	Mepilex	10 x 10 cm	Mölnlycke	5 Stück
3597	Mepilex	10 x 20 cm	Mölnlycke	5 Stück
3165	Mepilex border	7,5 x 7,5 cm	Mölnlycke	5 Stück
3166	Mepilex border	10 x 10 cm	Mölnlycke	5 Stück
3685	Mepilex border	15 x 20 cm	Mölnlycke	5 Stück
3774	Allevyn gentle border lite	5 x 5 cm	Smith & Nephew	10 Stück
3775	Aquacel foam non adhesive	10 x 10 cm	Convatec	10 Stück
3554	Momosan weiss pads unsteril	15x10x1 cm	Moltoplast	26 Stück
3676	Momosan weiss steril	15x10x1 cm	Moltoplast	20 Stück
	Hinweis: Biatain IBU softhold: Enthält den Wirkstoff Ibuprofen. Indikation : z.B.: PAVK mit starken Nacht- und Ruheschmerz			
3674 IND	Biatain IBU softhold	10 x 10 cm	Coloplast	5 Stück
3675 IND	Biatain IBU softhold	10 x 20 cm	Coloplast	5 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Suprasorb ST/M, Tielle/-Lite/, Askina THINsite,/-Touch/-Transorbent, Tegaderm Foam, Decutastar foam, Copa Island, Permafoam Schvb, Cutinova Hydro, Polymem, UrgoCell, Ligasano, u.v.m.)

5. Wundgele

Zusammensetzung: Hydrophiler Polyurethan-Polymere in wässriger Lösung. Eingelagert sind Gelatine, Pektine, Carboxymethylcellulose oder Alginate.

Wirkungsweise: Halten die Wunde feucht, schaffen optimales feuchtes Milieu

Indikation: Aufweichen und Ablösen von Schorf und Fibrinbelägen, Rehydratation trockener Wunden

Kontraindikation: Stark sezernierende oder blutende Wunden

Produktbesonderheiten:

- Nu Gel: enthält Natriumalginat
- Prontosan Wundreinigungsgel: enthält 0,1%-Betain, 0,1% Polihexanid
- Octenilin Gel: enthält Octenidine HCl. Nicht zur Daueranwendung, nicht auf Knorpel, nicht mit PVP Jod

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
283	Nu Gel Hydrogel+Alg. Hinweis: nur kurzfristige Anwendung	15 g	Chemomedica	10 Stück
3677	Hydrosorb Gel	8 g	Hartmann	5 Stück
3528	Prontosan Gel Hinweis: mit Polyhexanid, nach Anbruch 8 Wochen haltbar	30 ml	B.Braun	1 Stück
3678	Octenilin Gel Hinweis: mit Octenidine HCl, nach Anbruch 6 Wochen haltbar	20 ml	Schülke Mayr	1 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Normlgel, Comfeel purilon Gel, Curafil Wundgel, Tegaderm Hydrogel, Varihesiv Hydrogel, Decutastar Hydrogel, ApoCure, Hypergel, IntraSite Gel, Purilon Gel mit Alginat, Suprasorb ST/G, Urgo Hydrogel, Octenisept Wundgel, Repithel (Hydroaktives Gel mit Hydrosomen + PVP-Jod, u.v.m.)

6. a. Verbände mit Silber (IND!)

Zusammensetzung:

Atrauman Ag: Silberhaltige Salbenkompresse: Gitter aus Polyamid mit Silber ummantelt, imprägniert mit hydrophiler Salbe.

Acticoat Absorbent: Antimikrobieller Alginat-Verband setzt Silber frei, Gelbildung durch Aufnahme von Wundsekret. Kann bis zu 7 Tage bleiben.

Acticoat flex 3: Anschmiegsamer, einlagiger Verband, gibt 3 Tage Silber ab.

Wirkungsweise: Silber wirkt antibakteriell, geruchsbindend.
Die drei genannten Verbände sind zuschneidbar, können mit allen sekundären saugenden Wundauflagen kombiniert werden.

Indikation: **Infizierte Wunden nach entsprechender Vorbereitung des Wundbetts (ergänzend zur Behandlung der Infektion und der zugrundeliegenden Erkrankungen).**

IND!

- **Strenge Indikationsstellung**
- **Maximal für 14 Tage**
- **Primär nur der Bezug einer Verpackungseinheit.**

Kontraindikation: [1]

■ *Wenn keine Anzeichen einer lokalisierten (offenkundigen oder versteckten), sich ausbreitenden oder systemischen Infektion vorliegen*
■ *Bei sauberen Operationswunden mit geringem Infektionsrisiko, z.B. Hautentnahmestellen, geschlossene Operationswunden*
■ *Bei chronischen Wunden, die entsprechend den Begleiterkrankungen und Alter erwartungsgemäß verheilen*
■ *Bei kleinen akuten Wunden mit geringem Infektionsrisiko*
■ *Bei Patienten, die empfindlich auf Silber oder einen der Verbandsbestandteile reagieren*
■ *Bei Wunden, die enzymatisch debridiert werden*
■ *Während der Schwangerschaft oder in der Stillzeit*
■ *Bei Vorliegen von vom Hersteller genannten Kontraindikationen; beispielsweise raten einige Hersteller von der Anwendung von Silberverbänden bei Magnetresonanztomographien (MRT) oder auf/in der Nähe von Körperstellen, die mit Strahlentherapie behandelt werden, ab.*

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3776 IND	Atrauman AG Wundaufl.	5 x 5 cm	Hartmann	10 Stück
3777 IND	Atrauman AG Wundaufl.	10 x 10 cm	Hartmann	10 Stück
3778 IND	Acticoat absorbent	5 x 5 cm	Smith & Nephew	5 Stück
3779 IND	Acticoat absorbent	10 x 12,5 cm	Smith & Nephew	5 Stück
3689 IND	Acticoat flex 3 Silber	5 x 5 cm	Smith & Nephew	5 Stück
3690 IND	Acticoat flex 3 Silber	10 x 10 cm	Smith & Nephew	5 Stück

(Nicht gelistet: Curafil Impr.Str.+Silber: Silvercel Hydroalgin, Suprasorb ST/AG, Seasorb- Ag, Acticoat absorbent, Urgosorb Silver, Askina Calgitrol Ag, Textus bioactive, UrgoCell Silver, Urgotül S.Ag, Urgotül Silver, u.v.m.)

[1] *Internationaler Konsens. Adäquate Anwendung von Silberverbänden bei Wunden. Konsens einer Expertengruppe.* London: Wounds International, 2012. Download: www.woundsinternational.com, Seite 7.

6.b. Verbände mit Aktivkohle und Silber

Zusätzlich geruchsbindend durch Kohle.
Kostenübernahme zum Beispiel in der Palliativversorgung.

Zusammensetzung: Saugkompresse, mit Silber-Aktivkohle-Gewebe
Wirkweise: Nimmt Exsudat und Bakterien auf, unterbindet Geruch, Silber wirkt antibakteriell.
Darf nicht zerschnitten werden!
Indikation/Kontraindikationen: siehe bitte oben (unter 6.a.), zusätzlich geruchsbindend. Einsatz beispielsweise bei exulzerierenden Metastasen und therapieresistenten, übelriechenden Wunden.

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3780 IND	Actisorb 220 Chem	9,5X 6,5 cm	Gall-Pharma	10 Stück
3781 IND	Actisorb 220 Chem	9,5X 6,5 cm	Gall-Pharma	50 Stück
3782 IND	Actisorb 220 Chem	10,5X10,5cm	Gall-Pharma	10 Stück
3783 IND	Actisorb 220 Chem	10,5X10,5cm	Gall-Pharma	50 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Vliwaktiv Ag, Vliwaktiv Ag Tamponade, Opraclean, Carbonet, Askina Carbosorb, Actisorb Silver, -moisture control)

7a. Polyacrylat-Verbände, mit Ringer Lactat getränkt

Zusammensetzung: Mit Ringer Lactat getränktes Saugkissen aus superabsorbierenden Polyacrylaten und Zellulosefasern. Nässe-Schutzschicht auf der wundabgewandten Seite.
- TenderWet Plus: Zusätzlich mit Polyhexanid und wundseitigen Silikonstreifen

Wirkungsweise: Hält die Wunde feucht,
Ringerlösung wird 24 (TenderWet Plus bis zu 72) Stunden kontinuierlich an die Wunde abgegeben.
Wundsekret wird absorbiert,
Saug-Spülwirkung reinigt die Wunde, löst Nekrosen.
Hinweis: Wundrandschutz (Mazerationsgefahr!) nötig,
Sekundärverband nötig.
Indikation: Chronische, stagnierende Wunden mit Belägen, Nekrosen.
Infizierte Wunden
Produkte: TenderWet 24 Active/TenderWet Plus

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3114	TenderWet/24 active	5,5 cm rund	Hartmann	10 Stück
3116	TenderWet/24 active	7,5 x 7,5 cm	Hartmann	10 Stück
3117	TenderWet/24 active	10 x 10 cm	Hartmann	10 Stück
3784	TenderWet Plus	5,5 cm rund	Hartmann	10 Stück
3785	TenderWet Plus	7,5 x 7,5 cm	Hartmann	10 Stück

7b. Superabsorbierende Polyacrylat-Verbände

Zusammensetzung: Saugkissen aus Zellulose und superabsorbierenden Polyacrylaten
Wirkungsweise: Nimmt Sekret auf (auch unter Kompression), kann bis zum 1000-fachen des Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen, mindert Geruch und verhindert Mazeration
Indikation: Mäßig bis stark sezernierende Wunden, palliativer Einsatz
Produkte: Vliwasorb, Sorbion Sachet S

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3564	Vliwasorb	10 x 10 cm	L&R	10 Stück
3565	Vliwasorb	10 x 20 cm	L&R	10 Stück
3786	Sorbion Sachet S	7,5 x 7,5 cm	Sorbion	25 Stück
3566	Sorbion Sachet S	10 x 10 cm	Sorbion	25 Stück
3567	Sorbion Sachet S	10 x 18 cm	Sorbion	25 Stück
3787	Sorbion Sachet S	20 x 30 cm	Sorbion	25 Stück

(Nicht gelistete Produkte: Drymax, Drymax extra, Cutinova hydro (Schaum + Superabsorber), Sorbion Sana, Curea P1, Curea P2, Cutisorb Ultra, u.v.m.)

8. Wundrandschutz

Indikation: Mazerierter Wundrand
Produkte:
- DLine Zinkcreme: Weiche Zinkcreme, dünn aufgetragen, erst nach ca. 2-3 Tagen vorsichtig, ev. mit Öl entfernen.
- Cavilon: Polyacrylatlösung bildet ttransparenten Schutzfilm, erst nach 72 Stunden erneuern. Achten, dass der Schutzfilm ca. 15 Sekunden trocknet.

Hinweis: Wundrandschutz/pflege ist nicht prinzipiell notwendig! Es stört die Wundheilung, wenn unnötig am Wundrand manipuliert wird. Ist der Verband entsprechend und dem Grad der Exsudation angepasst und wird im richtigen Intervall gewechselt, bindet er das Exsudat und kann den Wundrand nicht schädigen oder mazerieren.

(Nicht gelistete Produkte: Comfeel Schutzcreme, Schutzfilm, Menalind professional Haut Protektor, Skin-Prep Hautschutztücher, Cutimed Protect, Secura, Silesse u.v.m.)

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3568	DLine Zink creme	50 g	L&R	1 Stück
3788	Cavilon Lolly	1 ml	3M	25 Stück
3789	Cavilon Lolly	3 ml	3M	25 Stück

9. Wundspüllösungen

Zusammensetzung: Ringerlösung oder physiologische Kochsalzlösung
Wirkungsweise: Reinigung von sekundär heilenden Wunden durch Ausspülen von Exsudat, Belägen und losen Nekrose-Partikel oder mit Hilfe befeuchteter Tupfern bei jedem Verbandswechsel. Anschließend erfolgt die Beurteilung.

Produkte:

- TenderWet Solution: 15 ml Ringer Lactat in Plastikdrehampullen
- NaCl 0,9% Ecolav: 100 ml physiologische Kochsalzlösung
- Ringer-Lactat-Ecolav: 100 ml Ringer Lactat Lösung
- Prontosan Wundspüllösung: enthält 0,1% Polihexanid und 0,1% Betain
  Haltbarkeit nach Anbruch 8 Wochen.
- Octenilin Wundspüllösung: enthält Glycerin, Ethylhexylglycerin und 0,05 % Octenidin HCl.
  Haltbarkeit nach Anbruch 8 Wochen.
  Nicht anwenden bei hyalinem Knorpel.

9. Wundspüllösungen

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3118	TenderWet Solution	15 ml	Hartmann	20 Stück
3681	NaCl 0,9 %, Ecolav	100 ml	B.Braun	20 Stück
3682	Ringer Lactat Ecolav	100 ml	B.Braun	20 Stück
3570	Prontosan	350 ml	B.Braun	1 Stück
3790	Octenilin Wundspüllösung	350 ml	Schülke & Mayr	1 Stück

Hinweis:
Als Antiseptika zugelassene Arzneimittel, wie zum Beispiel: Betaisodona Lösung, Octenisept sind Apothekenpflichtig.

- Polyvidon-Jodid-haltige Lösungen (z.B. Betaisodona, Wundesin) sollten aufgrund ihrer gewebetoxischen, und damit wundheilungsverzögernden Wirkung bestenfalls nur kurzfristig initial angewendet werden, aber nicht längerfristig.
- Wasserstoff: wird aktuell von den Experten aufgrund der Zytotoxizität als verzichtbar /bzw. obsolet bezeichnet.

10. Medizinischer Honig

Zusammensetzung: Honig (als Medizinprodukt zugelassen)
Wirkungsweise: Antibakteriell wirksam, dadurch auch geruchsmindernd, osmotische Aktivität, immunmodulierenden Wirkung, Verstärkung des autolytischen Debridements.
Saugfähiger Sekundärverband nötig,
kann bis zu 7 Tage auf der Wunde belassen werden.
Indikation: Geeignet für nekrotische, belegte oder infizierte Wunden, Wundhöhlen und Fisteln.

IND: Kostenübernahme für über längeren Zeitraum dokumentierte, stagnierende Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase, nicht als Mittel erster Wahl.

Produkte:

- Medihoney Antibakterieller Medizinischer Honig: reiner Honig
- Medihoney Antibakterielles Wundgel: enthält Wachse, die nicht resorbiert werden.
  Die Wachsreste müssen bei jedem Verbandswechsel entfernt werden.
  Nicht in Fisteln oder Wundhöhlen anwenden!

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3791 IND	Medihoney antib. med. Honey	50 g	Sorbion	1 Stück
3683 IND	Medihoney antib. med. Honey	20 g	Sorbion	5 Stück
3684 IND	Medihoney antib. Woundgel	20 g	Sorbion	5 Stück

(Nicht gelistete Produkte.: Activon Tube, Dermel, Melmax, Manuka, Revamil, Vivamel, L-Meristan Wundsalbe, u.v.m.)

11. Kollagen-Verbände

Zusammensetzung: Kollagen (aus der Kalbs- oder Schweinehaut)

Wirkungsweise: Mit dem Exsudat bildet sich ein Gel, bindet Proteasen, Radikale und Zytokine, wirkt blutstillend.
Bleibt bis zur vollständigen Resorption auf der Wunde.
Kollagen, das noch nicht resorbiert wurde, wird beim Wechsel des Sekundärverbandes (bis zu 5-7 Tagen) auf der Wunde belassen.
Für die Wahl des Sekundärverbandes (Saugkompressen, Hydrokolloidverbände, Schaumstoffkompressen, Wundfolien) ist entscheidend, dass das Kollagen nicht austrocknet.

Indikation: Stagnierende, chronische Wunden im Stadium der der Exsudationsphase (auch in der Granulationsphase und Epithelisierungsphase).

Kontraindikation: Infizierte Wunden, trockene Nekrosen

Hinweis: Kein Anwendung/bzw. Kontakt mit Jod, Desinfektionsmittel und eiweißfällenden Substanzen (Gerbsäure, Silbernitrat)

IND: Kostenübernahme für über längeren Zeitraum dokumentiert stagnierende, infektionsfreie Wunden ohne Nekrosen, nicht als Mittel erster Wahl.

Produkte: Promogran Wundverband

(Nicht gelistete Produkte: Suprasorb ST/C, ABE Coll, Promogran Prisma, Decutastar Biopad, Collagen Implant-Dressing, Catrix, Medical Biomaterial-Collagen, Nobakoll, u.v.m.)

Art.Nr.:	Bezeichnung:	Größe:	Firma:	1 VE =
3792 IND	Promogran Wundverband	28 ccm	Chemomedica	10 Stück